

¿Cómo prevenir la leptospirosis?

Usted puede tomar varias medidas para ayudar a prevenir la leptospirosis. Estas medidas incluyen las siguientes:

- Ir al veterinario para que les ponga a sus mascotas las vacunas que las protegen contra esta enfermedad.
- Evitar el contacto con orina o líquidos corporales de los animales, especialmente si tiene cortes o raspaduras en la piel.
- No nadar ni caminar por agua que pueda contener orina de animales y tampoco tragarla.
- Usar ropa y zapatos protectores cerca de tierra o agua que pueda estar contaminada con orina de animales.



Debes consumir agua segura (embotellada).



QUIENES ESTAN EN RIESGO

Siempre hay un riesgo de infección para las personas que tengan contacto con animales infectados, o con tierra o agua en donde las bacterias estén presentes.

Las personas que trabajan en exteriores o con animales pueden tener un mayor riesgo de infección, por ejemplo las siguientes:

- Campesinos o agricultores
- Mineros
- Trabajadores de alcantarillado
- Trabajadores de mataderos
- Veterinarios y cuidadores de animales
- Pescadores y personas que trabajan con peces
- Trabajadores de granjas lecheras
- Personal militar

TRATAMIENTO

• Adultos:


Doxiciclina 100mg c/12h x 7 días vo
Amoxicilina 500mg c/8h x 7 días vo
Eritromicina 500mg c/6h x 7 días vo

• Niños:

Amoxicilina 30-50mg/kg/día en 3 dosis x 7 días
Eritromicina 25-50mg/kg/día en 4 dosis x 7 días

• Gestantes:

Amoxicilina 500mg c/8h x 7 días vo
Eritromicina 500mg c/6h x 7 días vo



LEPTOSPIROSIS

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



UNAP



LEPTOSPIROSIS



“SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

SALUD OCUPACIONAL

PEVAS 551

LEPTOSPIROSIS



¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

Los síntomas de la leptospirosis se pueden presentar desde 2 días hasta 4 semanas después de haber estado expuesto a las bacterias.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

Síntomas similares a los de la influenza o gripe



¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que pueden producir infecciones potencialmente mortales de los riñones, el hígado, el cerebro, los pulmones o el corazón.

¿Cómo se contrae la leptospirosis?

Hay dos maneras comunes de contraer la leptospirosis:

- Al beber o tener contacto con agua (como al nadar, o ir en balsa o kayak), o tierra que haya sido contaminada por orina o líquidos corporales de animales infectados.
- Al estar expuesto a orina o líquidos corporales de animales infectados.

¿Cuáles animales pueden transmitir la leptospirosis a las personas?

Caballos
Búfalos
Ovejas
Cabras

Roedores
Mapaches

Ganado
Cerdos
Perros

FORMA CLINICA

Forma asintomática: comprobada su ocurrencia por la seroconversión.

Forma sintomática:

Enfermedad febril anictérica autolimitada: 85-90% de casos.

Síndrome de Weil: mas severa 5-10% de casos.

Período de incubación de 26 días.

DIAGNOSTICO

HUMANOS:

- Se sospecha por la clínica y la noción epidemiológica.
- La confirmación se obtiene con el aislamiento del germen o por técnicas serológicas, y se demuestra la presencia de IG M específicas.

