

complicaciones

La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 20 años.



Las más graves son la ceguera, encefalitis (infección acompañada de edema cerebral), diarrea grave (puede provocar deshidratación), las infecciones del oído y las infecciones respiratorias graves, como la neumonía.

TRATAMIENTO

No existe un tratamiento específico, sin embargo, el manejo sintomático de la enfermedad se realiza mediante la hidratación, medidas contra la fiebre y la prescripción de analgésicos.



¿Cómo se previene la enfermedad?



SE PREVIENE MEDIANTE LA VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN.

- La vacuna contra el sarampión suele juntarse con las vacunas contra la rubéola y/o la parotiditis en países donde estas enfermedades constituyen un problema.

- La eficacia de la vacuna es similar si se administra aisladamente como si se combina con estas vacunas.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



UNAP



SARAMPION



ALERTA SARAMPIÓN

"SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO"

SALUD OCUPACIONAL


PEVAS 551

SARAMPION

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.



El sarampión es causado por un virus, específicamente un paramixovirus del género Morbillivirus



A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz.

Se calcula que en 2008 murieron 164 000 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años.

¿Cómo se transmite?

El virus del sarampión es muy contagioso, y se transmite cuando una persona infectada habla, tose y/o estornuda

El virus presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo activo y contagioso hasta 2 horas, y puede ser transmitido por un individuo infectado desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las lesiones en la piel (exantema)



El sarampión se contagia al hablar, toser y/o estornudar

¿Cuáles son los síntomas?

El primer síntoma del sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza unos 10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días.



En la fase inicial, el paciente puede presentar rinorrea (catarro), ojos llorosos y rojos, tos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

Al cabo de varios días aparecen lesiones en la piel (exantema), generalmente en el rostro y la parte superior del cuello, que se extiende en unos 3 días, acabando por afectar a las manos y pies. El exantema dura 5 a 6 días, y luego se desvanece.

