


Etiología

La ***B. pertussis*** es una bacteria gram negativa que puede causar tos ferina en los humanos. En un principio la infección de por esta bacteria se evita gracias a la vacunación pero en caso de una persona de nuestro entorno se encuentre infectada por esta bacteria debemos tomar las medidas de protección e higiene adecuadas para evitar el contagio.

Bordetella Pertussis



Tratamiento tosferina

El tratamiento de la tosferina incluye el **uso de antibióticos para eliminar la bacteria** causante de la enfermedad y disminuir la gravedad de los síntomas. Los pacientes también pueden recibir **medicamentos para aliviar la tos y la congestión nasal**.

En casos graves, especialmente en bebés y niños pequeños, puede ser necesario el **tratamiento hospitalario** para controlar los síntomas y asegurar una correcta oxigenación.

COMPLICACIONES



APNEA

OTITIS MEDIA

NEUMONIAS

HEMORRAGIAS CONJUNTIVALES

LACERACION DEL FRENILLO LINGUAL



Prevención

IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

- ♥ Previene complicaciones graves en la persona recién nacida.
- ♥ Asegura que tanto la madre como su bebé tengan los anticuerpos necesarios.
- ♥ Reduce la propagación de la tos ferina en la comunidad.



UNAP

TOS FERINA



"SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"



SALUD OCUPACIONAL

PEVAS 551

TOS FERINA

La tosferina es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria [Bordetella pertussis](#).

Se transmite principalmente a través de gotas de saliva en el aire cuando una persona infectada tose o estornuda y puede afectar a personas de todas las edades, pero es especialmente peligrosa para bebés y niños pequeños.



Las personas que conviven y cuidan al bebé (la madre, el padre, los hermanos, los abuelos y los cuidadores) son las que principalmente pueden transmitirle la tosferina a través de la tos y los estornudos.

Síntomas de la tosferina

Lo principal es la tos seca y persistente que puede durar hasta 10 semanas.

Esta tos puede ser tan severa que puede llevar a la pérdida de la conciencia en bebés y niños pequeños, lo que puede resultar en complicaciones graves como convulsiones o daño cerebral.



Además de la tos, otros **síntomas comunes de la tosferina** incluyen: alteraciones del humor, concentración, memoria, aprendizaje y tiempos de reacción.

1. Congestión nasal
2. Estornudos
3. Fiebre baja
4. Moco nasal espeso y verde o amarillo
5. Respiración acelerada o dificultosa
6. Vómitos después de toser

Síntomas de la tosferina

En bebés, los síntomas pueden ser más graves y pueden incluir apneas, que son pausas en la respiración de una duración de hasta 20 segundos. También pueden presentar dificultad para respirar y problemas para alimentarse debido a la tos.



los síntomas de la tosferina pueden variar según la edad y la salud de la persona afectada. En adultos, los síntomas pueden ser menos evidentes y parecer similares a los de un resfriado común. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad sea menos peligrosa.

