

COMO SE DIAGNOSTICA

Toda persona con flema y tos por más de 15 días debe acudir de inmediato al establecimiento de salud donde le realizaran un examen de flema o esputo



RADIOGRAFIA DE TORAX



TRATAMIENTO

La tuberculosis se trata con antibióticos especializados. El médico indicará cuáles medicamentos deberá tomar y por cuántos meses.



PREVENCION



AMBIENTES VENTILADOS

E ILUMINADOS



LA LUZ SOLAR MATA A LOS BC
ALIMENTARSE SALUDABLEMENTE



CUBRIRSE AL ESTORNUDAR


COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



UNAP



TUBERCULOSIS (TB)



"SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO"

SALUD OCUPACIONAL

PEVAS 551

TUBERCULOSIS

Es una enfermedad infecciosa causada por *Mycobacterium tuberculosis*, una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos. Aunque es la enfermedad infecciosa que causa más muertes en el mundo, es curable y prevenible.

TUBERCULOSIS COMO ENFERMEDAD OCUPACIONAL

La TB debe ser considerada una enfermedad ocupacional o profesional en aquellas personas que la contraen a causa de su trabajo (efecto de causalidad); es decir, que, si no desempeñasen tal oficio o profesión, esta enfermedad no se hubiese producido o hubiese sido igual de frecuente que en la población general.

En otras palabras, cuando la TB afecta al trabajador que está en contacto directo y frecuente con enfermos con TB, animales enfermos o materiales infectados con el bacilo tuberculoso, si no se demuestra otra forma de contagio no laboral, se la debe considerar una enfermedad profesional.

Como se transmite



Tose, estornuda o escupe, expulsa al aire pequeñas gotas con bacilos tuberculosos.

¿Cuáles tipos hay?

La tuberculosis pulmonar: cuando la infección se mantiene en los pulmones. Es la forma más frecuente y contagiosa.

La tuberculosis extrapulmonar: cuando la bacteria se traslada a otros órganos por medio de la sangre o de los ganglios linfáticos.

Sintomas

- Tos con flemas por más de 3 semanas
- Sangrado y dolor al respirar y toser
- Pérdida repentina de peso
- Fatiga
- Fiebre
- Sudoraciones nocturnas o escalofríos

No sólo las personas con síntomas deben buscar atención médica. Si convive o tiene contacto directo con una persona diagnosticada con tuberculosis también debe buscar atención.

