

¿Cómo prevenir la leptospirosis?

Usted puede tomar varias medidas para ayudar a prevenir la leptospirosis. Estas medidas incluyen las siguientes:

- Ir al veterinario para que les ponga a sus mascotas las vacunas que las protegen contra esta enfermedad.
- Evitar el contacto con orina o líquidos corporales de los animales, especialmente si tiene cortes o raspaduras en la piel.
- No nadar ni caminar por agua que pueda contener orina de animales y tampoco tragarla.
- Usar ropa y zapatos protectores cerca de tierra o agua que pueda estar contaminada con orina de animales.



Debes consumir agua segura (embotellada).

QUIENES ESTAN EN RIESGO

La leptospirosis también puede ser un riesgo ocupacional para los que trabajan al aire libre o con animales, por ejemplo los plantadores de arroz y caña de azúcar, agricultores, trabajadores en alcantarillas, veterinarios, trabajadores de lechería, y personal militar. También puede ser un riesgo para aquellos que hacen recreación en aguas contaminadas.

- Campesinos o agricultores
- Mineros
- Trabajadores de alcantarillado
- Trabajadores de mataderos
- Veterinarios y cuidadores de animales
- Pescadores y personas que trabajan con peces
- Trabajadores de granjas lecheras
- Personal militar



TRATAMIENTO

• Adultos:

Doxiciclina 100mg c/12h x 7 días vo

Amoxicilina 500mg c/8h x 7 días vo

Eritromicina 500mg c/6h x 7 días vo

• Niños:

Amoxicilina 30-50mg/kg/día en 3 dosis x 7 días

Eritromicina 25-50mg/kg/día en 4 dosis x 7 días

• Gestantes:

Amoxicilina 500mg c/8h x 7 días vo

Eritromicina 500mg c/6h x 7 días vo



LEPTOSPIROSIS


COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



UNAP



Leptospirosis



"SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"

SALUD OCUPACIONAL

PEVAS 551

LEPTOSPIROSIS



La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira.

¿Cómo se contrae la leptospirosis?

- Hay dos maneras comunes de contraer la leptospirosis:
- Al beber o tener contacto con agua (como al nadar, o ir en balsa o kayak), o tierra que haya sido contaminada por orina o líquidos corporales de animales infectados.
 - Al estar expuesto a orina o líquidos corporales de animales infectados.

¿Cuáles animales pueden transmitir la leptospirosis a las personas?

Caballos
Búfalos
Ovejas
Cabras

Roedores
Mapaches



Ganado
Cerdos
Perros

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

Los síntomas de la leptospirosis se pueden presentar desde 2 días hasta 4 semanas después de haber estado expuesto a las bacterias.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

Síntomas similares a los de la influenza o gripe



Sd Febril Agudo

Gota Gruesa

SIN SIGNOS DE ALARMA

CON SIGNOS DE ALARMA

Vómitos
Dolor abdominal
Sangrados
Postración
Artralgia severa

Manejo Ambulatorio

Tratamiento : SRO
Paracetamol

HOSPITALIZACIÓN

-Hidratación EV. Dimenhidrinato/Metamizol según necesidad
-Terapia según diagnóstico clínico

1 día	2 día	3 día	4 día	5 día	6 día	7 día
SINTOMAS COMUNES						
FIEBRE, CEFALEA, ESCALOFRIOS		PLAQUETOPENIA				
NAUSEAS, DOLOR DE CUERPO						
DENGUE		RASH ,SANGRADOS ,SHOCK		Leucopenia, linfocitosis		
CHIKUNGUNYA :ARTRALGIA		ARTRITIS ,RASH, EXANTEMA		Leucopenia, linfopenia		
MALARIA		FIEBRE PERSIST , EPIDEMIOL		Anemia		
LEPTOSPIROSIS		DIFICULTAD RESPIRATORIA, ICTERICIA,HEMOPTISIS		Leucocitos Normal ó Leucocitosis		

FORMA CLINICA

Forma asintomática: comprobada su ocurrencia por la seroconversión.
Forma sintomática:
Enfermedad febril anictérica autolimitada: 85-90% de casos.
Síndrome de Well: mas severa 5-10% de casos.
Período de incubación de 26 días.

DIAGNOSTICO

HUMANOS:

- Se sospecha por la clínica y la noción epidemiológica.
- La confirmación se obtiene con el aislamiento del germen o por técnicas serológicas, y se demuestra la presencia de IG M específicas.

