

# DIAGNÓSTICO

No existe una prueba específica que apunte al diagnóstico de laberintitis. El diagnóstico se realiza en base a los síntomas del paciente, el examen físico y la historia clínica.

Prueba de impulso cefálico sugestiva de lesión en el oído derecho. La mirada se desvía junto con la cabeza hacia la derecha.

PRUEBA CON RESULTADO NORMAL




PRUEBA SUGESTIVA DE LESIÓN DEL LABERINTO DERECHO



# TRATAMIENTO

Es una condición autolimitada que mejora por sí sola...



**Reposo e hidratación están indicados para todos los casos.**

**LABERINTITIS VIRAL: CORTICOIDES**

**ANTIHISTAMINICOS**

**ANTIEMETICOS**

**LABERINTITIS BACTERIANA: ANTIBIOTICOS**

La recuperación es gradual durante algunas semanas, y la fisioterapia puede ayudarle a recuperarse más pronto. Para que su cerebro pueda utilizar la información del equilibrio que viene de sus oídos internos, es necesario que ambos oídos trabajen bien.

Su fisioterapeuta puede darle ejercicios para ayudarle a acostumbrarse a estos cambios en su oído interno. Estos ejercicios son muy eficaces y es normal tener algunos mareos mientras los realiza.




**UNAP**



# LABERINTITIS



## INFLAMACION DEL OIDO



## COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## FACTORES DE RIESGO

## Causas

La inflamación del laberinto afecta sus estructuras, interfiere con el movimiento de líquidos en su interior e incluso dificulta la transmisión de impulsos nerviosos al cerebro. Con esto, el cerebro comienza a malinterpretar las señales del oído interno, dando como resultado síntomas como mareos, desequilibrio, náuseas e incluso pérdida

Algunos factores aumentan el riesgo de desarrollar laberintitis.

Los principales son:

1. Consumo frecuente y exagerado de bebidas alcohólicas.
2. Cansancio.
3. Antecedentes de alergias.
4. Tabaquismo
5. Estrés.
6. Consumo excesivo de café.

## Síntomas

- Vértigos.
- Náuseas con o sin vómitos.
- Desequilibrio.
- Pérdida de la audición.
- Tinnitus (zumbido en los oídos).
- Nistagmo (movimientos oculares laterales involuntarios).

En la laberintitis, no están presentes otros signos y síntomas neurológicos, como alteración del habla, dificultad para tragar, desorientación, pérdida de fuerza en las extremidades, pérdida de sensibilidad y dolor de cabeza.

## LABERINTITIS

ES UNA INFLAMACIÓN DEL OÍDO INTERNO OCURRE CUANDO EL NERVIQ QUE VA AL OÍDO INTERNO SE INFECTA POR UN VIRUS O UNA BACTERIA.

El daño al nervio del oído interno afecta su equilibrio y también el sentido del oído (la habilidad de escuchar)

Cuando el nervio es dañado, puede ser que usted tenga mareos, vértigo (la sensación de que todo le da vueltas), muy poco equilibrio, y cambios en su habilidad de escuchar.

Su doctor puede casi siempre determinar la causa de la infección y el mejor tratamiento médico si se le detecta

### VIRAL

- Influenza (gripe).
- Parainfluenza (resfriado).
- Adenovirus (resfriado y gastroenteritis).
- Virus sincitial respiratorio (resfriado).
- Citomegalovirus.
- Paramixovirus ([paperas](#)).
- Varicela-zoster ([varicela](#) y herpes zóster)
- Virus de la [rubéola](#).
- Herpes simple 1 ([herpes labial](#))
- Coxsackievirus (enfermedad de manos, pies y boca).

### BACTERIANAS

- *Streptococcus pneumoniae*.
- *Haemophilus influenzae*.
- *Moraxella catarrhalis*.
- *Neisseria meningitidis*.
- *Streptococcus* sp.
- *Staphylococcus* sp.
- *Proteus* sp.
- *Bacteroides* sp.
- *Mycobacterium tuberculosis*.